TD5 - Intégration

Exercice 1

Déterminer une primitive des fonctions suivantes.

1. $x \mapsto x$

2. $x \mapsto 1$

3. $x \mapsto 2x$

4. $x \mapsto 3x$

5. $x \mapsto x - 1$

6. $x \mapsto e^x$

7. $x \mapsto e^x + 1$

8. $x \mapsto \frac{1}{x}$

9. $x \mapsto \frac{1}{x+1}$

10. $x \mapsto \frac{2}{x+1}$

11. $x \mapsto \frac{2x}{x^2+1}$

12. $x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$

13. $x \mapsto \frac{e^x}{e^x+1}$

14. $x \mapsto 2xe^{x^2}$

15. $x \mapsto xe^{x^2}$

16. $x \mapsto \frac{x}{e^{x^2}+1}$

Exercice 2

Calculer les intégrales suivantes.

1. $\int_{-1}^1 x \, dx$

2. $\int_{-1}^1 x^3 \, dx$

3. $\int_{-1}^1 x^5 \, dx$

4. $\int_0^3 x^2 + 1 \, dx$

5. $\int_{-2}^{-1} (x+1)^2 \, dx$

6. $\int_5^3 2x + 1 \, dx$

7. $\int_1^e \frac{1}{x} \, dx$

8. $\int_{-1}^1 2xe^{x^2+1} \, dx$

9. $\int_0^1 \frac{1}{x+1} \, dx$

10. $\int_{-3}^3 e^{3x+1} \, dx$

11. $\int_0^1 xe^{x^2+x} + \frac{1}{2}e^{x^2+x} \, dx$

12. $\int_{-\ln(2)}^{\ln(3)} (1 - 2e^{-t}) \, dx$

13. $\int_1^2 \frac{1}{2\sqrt{x}} \, dx$

14. $\int_0^1 \frac{2t}{\sqrt{1+t^2}} \, dt$

15. $\int_e^{e^2} \frac{1}{x \ln(x)} \, dx$

16. $\int_1^e \frac{\ln(x)}{x} \, dx$

Exercice 3

Calculer les intégrales suivantes en utilisant une intégration par partie.

1. $\int_0^1 xe^{-x} \, dx$

2. $\int_1^e x \ln(x) \, dx$

3. $\int_1^2 \ln(x) \, dx$

4. $\int_0^1 (1 - 2x^2)e^{-x} \, dx$

Exercice 4

Soient f et g les fonctions définies sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels par :

$$f(x) = xe^{1-x}, \quad g(x) = x^2e^{1-x}.$$

Les courbes représentatives des fonctions f et g dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ sont respectivement notées $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$:

Étude des fonctions f et g.

1. Déterminer les limites des fonctions f et g en $-\infty$.
2. Justifier le fait que f et g ont pour limite 0 en $+\infty$.
3. Étudier le sens de variations de chacune des fonctions f et g et dresser leurs tableaux respectifs.

Calculs d'intégrales. Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on définit l'intégrale I_n par :

$$I_n = \int_0^1 x^n e^{1-x} dx$$

1. Calculer la valeur exacte de I_0 .
2. A l'aide d'une intégration par parties, démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$I_{n+1} = -1 + (n+1)I_n$$

3. En déduire la valeur exacte de I_1 , puis celle de I_2 .

Calcul d'une aire plane.

1. Étudier la position relative des courbes $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$.
2. On désigne par $\mathcal{A}$ l'aire, exprimée en unité d'aire, de la partie du plan comprise d'une part entre les courbes $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$, d'autre part entre les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$. Déterminer la valeur précise de $\mathcal{A}$.

Étude de l'égalité de deux aires. Soit a un réel strictement supérieur à 1. On désigne par $S(a)$ l'aire, exprimée en unité d'aire, de la partie du plan comprise d'une part entre les courbes $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$, d'autre part entre les droites d'équations $x = 0$ et $x = a$. On admet que $S(a) = 3 - e^{1-a}(a^2 + a + 1)$.

L'objectif de cette question est de prouver qu'il existe une unique valeur a tel que $S(a) = \mathcal{A}$.

1. Montrer que l'équation $S(a) = \mathcal{A}$ équivaut à l'équation

$$e^a = a^2 + a + 1.$$

2. Conclure.

Exercice 5

Étant donné un nombre réel k , on considère la fonction f_k définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f_k(x) = \frac{1}{1 + e^{-kx}}$$

Partie A. Dans cette partie on choisit $k = 1$. On a donc, pour tout réel x , $f_1(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$ dont la courbe $\mathcal{C}_1$ est

- Déterminer les limites de f_1 en $+\infty$ et $-\infty$ et interpréter graphiquement les résultats obtenus.
- Démontrer que pour tout réel x , $f_1(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$.
- Calculer, pour tout réel x , $f_1'(x)$. En déduire les variations de f_1 sur $\mathbb{R}$.
- On définit le nombre $I = \int_0^1 f_1(x) dx$. Montrer que $I = \ln\left(\frac{1+e}{2}\right)$. Donner une interprétation graphique de I .

Partie B. Dans cette partie, on choisit $k = -1$ et on souhaite tracer la courbe $\mathcal{C}_{-1}$ représentant la fonction f_{-1} . Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on appelle P le point de $\mathcal{C}_1$ d'abscisse x et M le point de $\mathcal{C}_{-1}$ d'abscisse x . On note K le milieu du segment $[MP]$.

- Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f_1(x) + f_{-1}(x) = 1$.
- En déduire que le point K appartient à la droite d'équation $y = \frac{1}{2}$.
- Tracer la courbe $\mathcal{C}_{-1}$ dans le repère de la partie précédente.
- En déduire l'aire, en unité d'aire, du domaine délimité par les courbes $\mathcal{C}_{-1}$, $\mathcal{C}_1$, l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = 1$.

Partie C. Dans cette partie, on ne privilégie pas de valeur particulière du paramètre k .

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fautive et justifier la réponse.

- Quel que soit le réel k , la représentation graphique de la fonction f_k est strictement comprise entre les droites d'équations $y = 0$ et $y = 1$.
- Quel que soit la valeur du réel k , la fonction f_k est strictement croissante.
- Pour tout réel $k \geq 10$, $f_k\left(\frac{1}{2}\right) \geq 0.99$.

Exercice 6

On considère la fonction g définie pour tout réel $x \in [0; 1]$ par :

$$g(x) = 1 + e^{-x}.$$

On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction g dans un repère orthogonal, et $\mathcal{D}$ le domaine du plan compris d'une part entre $\mathcal{C}$ et l'axe des abscisses et d'autre part entre les droites d'équation $x = 0$ et $x = 1$.

Le but de cet Exercice est de partager le domaine $\mathcal{D}$ en deux domaines de même aire, d'abord par une droite parallèle à l'axe des ordonnées (partie A), puis par une droite parallèle à l'axe des abscisses (partie B).

Partie A. Soit a un nombre réel tel que $0 \leq a \leq 1$. On note $\mathcal{A}_1$ le domaine du plan compris d'une part entre $\mathcal{C}$ et l'axe des abscisses et d'autre part entre les droites d'équation $x = 0$ et $x = a$ et $\mathcal{A}_2$ le domaine du plan compris d'une part entre $\mathcal{C}$ et l'axe des abscisses et d'autre part entre les droites d'équation $x = a$ et $x = 1$.

1. (a) Démontrer que $\mathcal{A}_1 = a - e^{-a} + 1$.
 (b) Exprimer $\mathcal{A}_2$ en fonction de a .
2. Soit f la fonction définie sur $[0; 1]$ par $f(x) = 2x - 2e^{-x} + \frac{1}{e}$.
 (a) Dresser le tableau de variation de la fonction f sur $[0; 1]$. On précisera les valeurs exactes de $f(0)$ et $f(1)$.
 (b) Démontrer que la fonction f s'annule une et une seule fois sur l'intervalle $[0; 1]$ en un réel α . Donner la valeur arrondie au centième de α .
3. En déduire une valeur approchée du réel a pour lequel les aires $\mathcal{A}_1$ et $\mathcal{A}_2$ sont égales.

Partie B. Soit b un nombre réel positif. Dans cette partie on se propose de partager le domaine $\mathcal{D}$ en deux domaines de même aires par la droite d'équation $y = b$. On admet qu'il existe un unique réel b positif solution.

1. Justifier que $b < 1 + \frac{1}{e}$. On pourra utiliser un argument graphique.
2. Déterminer la valeur exacte du réel b .

Exercice 7

Dans tout ce qui suit, m désigne un nombre réel quelconque.

Partie A. Soit f la fonction définie et dérivable sur l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ telle que

$$f(x) = (x + 1)e^x.$$

1. Calculer la limite de f en $+\infty$ et $-\infty$.
2. Déterminer f' la fonction dérivée de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
3. Dresser le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.

Partie B. On définit la fonction g_m sur $\mathbb{R}$ par : $g_m(x) = x + 1 - me^{-x}$ et on note $\mathcal{C}_m$ la courbe de la fonction g_m dans un repère orthonormal du plan.

1. (a) Démontrer que $g_m(x) = 0$ si et seulement si $f(x) = m$.
 (b) Déduire de la partie A, sans justification, le nombre de points d'intersection de la courbe $\mathcal{C}_m$ avec l'axe des abscisses en fonction du réel m .
2. On a représenté les courbes $\mathcal{C}_0$, $\mathcal{C}_e$, et $\mathcal{C}_{-e}$ (obtenues en prenant respectivement pour m les valeurs 0, e et $-e$). Identifier chacune de ces courbes sur la figure en justifiant.

3. Étudier la position de la courbe $\mathcal{C}_m$ par rapport à

la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = x + 1$ suivant les valeurs du réel m .

4. (a) On appelle D_2 la partie du plan comprise entre les courbes $\mathcal{C}_e$, $\mathcal{C}_{-e}$, l'axe des ordonnées et la droite $x = 2$. Hachurer D_2 sur le graphique précédent.
- (b) Dans cette question, a désigne un réel positif, D_a la partie du plan comprise entre $\mathcal{C}_e$, $\mathcal{C}_{-e}$, l'axe des ordonnées et la droite Δ_a d'équation $x = a$. On désigne par $\mathcal{A}(a)$ l'aire de cette partie du plan, exprimée en unités d'aire.
 Démontrer que pour tout réel a positif : $\mathcal{A}(a) = 2e - 2e^{1-a}$.
 En déduire la limite de $\mathcal{A}(a)$ quand a tend vers $+\infty$.